



*Viburnum setigerum* 'Aurentiacum'

# Viburnum setigerum

door: Ward van Teylingen

## Indeling in secties

Binnen het geslacht *Viburnum* wordt nog steeds de indeling volgens Rehder gevolgd. In 1908 verdeelde Rehder *Viburnum* in secties. Volgens de tegenwoordige indeling bestaat het geslacht *Viburnum* uit elf secties. Het voert te ver om hier alle secties te benoemen.

De *Viburnum* waar ik deze keer de aandacht op wil vestigen staat in sectie 8. Die bestaat uit o.a. *V. betulifolium*, *V. dentatum*, *V. dilatatum*, *V. hupehense*, *V. lobophyllum*, *V. setigerum* en *V. wrightii*. Deze sectie heet Odontinus (Rehder).

## *Viburnum setigerum*

De soort die ik nu wil beschrijven is *Viburnum setigerum*. Dit is een soort die in Centraal- en West-China in de natuur voorkomt. Dus schrijven we *setigerum* niet met een hoofdletter, maar met een kleine letter. Het is een bijzonder mooie soort, die opvalt door het afwijkende blad en de losse groeiwijze. Van nature groeit deze struik in droge rivierbeddingen, dus een wat kleiachtige bodem vindt hij wel fijn. Zo'n rivierbedding bevat nl. veel mineralen en ook kalkdeeltjes en dat is nu net wat onze *Viburnum* nodig heeft om tot wasdom te komen. In de natuur wordt hij wel vijf meter hoog en dan nog is het een ijle struik: hij vertakt niet zo makkelijk.

## Plantbeschrijving

Groeiwijze: bladverliezende, opgaande struik tot 3 à 4 m hoog, twijgen kaal, eerst grijsbruin, later grijs. Bladeren: vaak hangend, ovaal-langwerpig, 10-12 cm lang, bovenzijde glimmend donkergroen, onderzijde opvallend lichter, rand vanaf eenderde tot de top grof getand, top lang toegespitst. Bloeiwijze: opstaande tuilen, ongeveer 5 cm breed; bloemen wit in schermen, mei- juni. Vruchten: helderrood, 6-8 mm lang, ovaal.

Het is een gemakkelijk bloeiende plant. Op de eenjarige enten stonden al bloemen en doordat ze goed bestoven werden gaven ze ook al direct de rode vruchten (bessen). De takken met bes blijven zeker een week goed op de vaas.

Dan is er ook nog een cultivar van, te weten: *V. setigerum* 'Aurentiacum'. Deze cultivar werd in het Arnold Arboretum ontwikkeld uit zaad dat E.H. Wilson in 1907 in China verzamelde. Het is een plant, die in alle delen gelijk is aan de soort (*setigerum*) maar afwijkt doordat de vruchten prachtig oranjegeel zijn. Eigenlijk is het een *forma*, een vorm van de soort, want in alle delen is hij direct herkenbaar als de soort. Alleen de kleur van de vruchten is afwijkend. Ook de takken van deze cultivar zijn een waardevolle aanwinst voor de bloemsierkunst. 